NOTE V.

CLAVICORNES DE GRENADA ET DE S^{T}. VINCENT (ANTILLES) RÉCOLTÉS PAR M. H. H. SMITH, ET APPARTENANT AU MUSÉE DE CAMBRIDGE

PAR

A. GROUVELLE.

Brachypterus insularis, n. sp.

Oblongus, convexus, nitidus, glaber, testaceus; clava antennarum leviter infuscata; capite sat grosse punctato; prothorace transverso, punctato, angulis posticis rotundatis, basi lateribusque stricte marginatis; elytris sat dense punctatis. — Long. $1^1/_2$ mill.

Oblong, convexe, brillant, glabre, testacé; massue des antennes légèrement enfumée. Tête convexe, assez fortement ponctuée. Prothorax transversal, arrondi aux angles postérieurs, étroitement rebordé à la base et sur les côtés, plus densément ponctué sur les côtés que sur le disque. Ecusson largement arrondi au sommet, ponctué. Elytres un peu moins longs que larges ensemble, assez densément ponctués, un peu obliquement tronqués au sommet. Segments visibles de l'abdomen assez densément ponctués.

Hab. Grenada — Mount Gay Estate (leeward side).

Pallodes Smithi, n. sp.

Ovatus, convexus, nitidus, glaber, niger; antennis clava excepta pedibusque testaceis; capite parce punctulato; pro-

thorace transverso, utrinque vix perspicue punctulato, basi medio leviter retrorsum prominente; scutello triangulari; elytris vix perspicue lineato-punctatis, stria suturali impressa, antice evanescente. — Long. $2^1/_2$ à 4 mill.

Ovale, court, convexe, brillant, glabre, noir; antennes sauf la massue, bouche et pattes testacées. Articles 3 à 5 des antennes un peu plus longs que larges, sensiblement égaux; massue en ovale un peu allongé, dernier article aussi long que les deux premiers réunis, comprimé au sommet en lame et présentant latéralement deux zônes, la première, à la base, demi-circulaire lisse, et la deuxième occupant le reste de la surface finement pubescente. Tête éparsement pointillée. Prothorax très transversal, lisse sur le disque, éparsement pointillé sur les côtés. Ecusson triangulaire. Elytres un peu plus longs que larges ensemble, très finement ponctués en lignes; strie suturale bien marquée, atténuée à la base, rapprochée de la suture. Tibias intermédiaires assez larges; hanches postérieures non contigues, assez rapprochées.

Hab. Grenada — Black Forest Estate, Mt. Maitland, Chantilly Estate.

Pallodes cyanescens, n. sp.

Ovatus, convexus, glaber, cyaneo-micans; antennis clava excepta, margine antico capitis, prothorace, subtus pedibusque rufo-testaceis; capite parce punctulato; prothorace transverso, utrinque vix perspicue punctulato, basi medio subemarginato, haud retrorsum prominente, basi cyaneo stricte marginata; scutello triangulari; elytris leviter punctato-lineatis, stria suturali impressa, antice evanescente. — Long. 3 à 4 mill.

Ovale, court, convexe, glabre, roux testacé, avec la base de la tête, une étroite bordure à la base du prothorax et les élytres d'un bleu soyeux, peu brillant. Articles 2 à 4 des antennes notablement plus longs que larges, 5me un peu plus long; massue noire, comprimée, dernier article aussi long que les deux premiers réunis, présentant sensiblement le profil d'un rectangle surmonté d'un trapèze; zône lisse de la base subdemicirculaire. Prothorax très transversal, lisse sur le disque, éparsement pointillé sur les côtés; base légèrement sinuée au milieu devant l'écusson. Ecusson triangulaire. Elytres sensiblement aussi longs que larges ensemble, finement pointillés en lignes, arrondis séparément au sommet; strie suturale bien marquée, atténuée à la base. Partie visible de l'abdomen noirâtre. Tibias intermédiaires assez larges; hanches postérieures non contigues, mais peu éloignées.

Hab. St. Vincent (leeward side).

Microsicus minimus, n. sp.

Oblongo-elongatus, modice convexus, opacus, setosus; capite prothoraceque infuscatis, elytris sordido-testaceis, nigrovariegatis; prothorace transverso, lateribus parallelis, antice arcuatis, ciliatis, disco subimpresso; elytris substriatis. — Long. $1^3/_4$ mill.

Oblong, allongé, médiocrement convexe, opaque, couvert de courtes soies dressées, squamiformes, entremêlées de soies plus courtes, plus fines, plus ou moins couchées, n'ayant pas d'orientation régulière. Tête noirâtre, plus claire au sommet, labre bien développé. Prothorax environ une fois et demie aussi long que large, côtés parallèles, arqués en dedans au sommet, ciliés; disque présentant les traces de plusieurs impressions dessinées surtout par la condensation de la squamulation. Elytres ovales, environ une fois et demie plus longs que larges dans la plus grande largeur, un peu plus larges que le prothorax, environ trois fois plus longs, profondément ponctués-striés; chacun avec une dizaine de petites taches noires, dont une contre la base, vers le milieu, trois sur le troisième intervalle, trois sur l'avant dernier intervalle latéral et les trois dernières placées, la 1re en dedans et plus près de la base que la 1re latérale, la 2me sur le 5me intervalle, un peu plus loin que la 2me dorsale et la 3me près du bord latéral vers le niveau de la 3me dorsale. Antennes et pattes claires.

Hab. Grenada — Mount Gay Estate (leeward side).

Catolœmus exilis, n. sp.

Oblongus, sat convexus, opacus, niger, testaceo-ferrugineo variegatus, squamoso-hispidus; antennis pedibusque rufo-testaceis; prothorace transverso, antice posticeque angustato, lateribus arcuatis, ciliatis; elytris lineato-punctatis. — Long. 1½ mill.

Oblong, assez convexe, opaque, noir, varié de roux testacé, couvert de soies dressées, courtes, squamiformes, tantôt claires, tantôt foncées. Bord antérieur de la tête plus clair; squamules entremêlées de petites soies très courtes. Prothorax un peu plus de deux fois plus large que long, rétréci à la base et au sommet, arqué sur les côtés, noir avec les marges antérieures et latérales plus claires; disque vaguement impressionné; bord antérieur largement et peu profondément échancré; bords latéraux ciliés. Elytres un peu plus larges que le prothorax, environ une fois et demie aussi longs que larges ensemble, ponctués en lignes; points serrés, intervalles sensiblement plus larges que les points; bords latéraux ciliés.

Hab. Grenada — Mount Gay Estate (leeward side).

La coloration de cette espèce peut varier considérablement. Chez l'insecte bien coloré que nous décrivons, le fond des élytres est roux testacé, avec une tache suturale triangulaire près de la base orientée vers le sommet, une bande latérale ondulée enfermant le long du bord un espace mal défini, et deux bandes suturales transversales, la première à peu près au niveau de l'extrémité de la bande latérale, la 2me entre la précédente et le sommet. Lorsque la couleur claire se développe, les taches noires s'atténuent et deviennent brunes.

Neotrichus insularis, n. sp.

Elongatus, parallelus, convexus, niger, opacus, flavo-

setosus; fronte arcuatim impressa, tuberculata; prothorace vix elongato, basin versus subangustato, tuberculato, lateribus obtuse denticulatis; elytris lineato-punctatis, intervallis undulatis. — Long. $3^1/_2$ à 6 mill.

Allongé, parallèle, convexe, noir, opaque, garni de soies dressées, flaves, disposées en lignes sur les élytres. Tête transversale, couverte d'assez forts tubercules; front avec une assez forte impression arquée en avant, passant de chaque côté auprès des yeux, ceux-ci non saillants. Prothorax un peu plus long que large, légèrement rétréci à la base, chargé de tubercules ocellés laissant un vague sillon longitudinal sur le disque; bord antérieur arqué, très faiblement relevé en bourrelet, bords latéraux obtusément denticulés. Ecusson petit, suborbiculaire. Elytres environ trois fois aussi longs que larges ensemble, avec des lignes d'impressions ponctiformes qui donnent aux intervalles un aspect ondulé dans le sens de la longueur.

Hab. Grenada — Balthazar (windward side); St. Vincent.

Espèce très variable de taille; parfois le vague sillon longitudinal du prothorax s'accentue et devient presque une impression et les côtés du prothorax s'arrondissent légèrement.

Neotrichus tuberculatus (Chevrolat).

Il faut rapporter au genre *Neotrichus* Sharp le *Plagiope tuberculata* Chevrolat (Ann. Soc. entom. de France, 4e sér. tome III, 1863, p. 607).

Hab. Cuba.

Lemnis denticulatus, n. sp.

Oblongus, subdepressus, dense squamoso-flavo-griseus, griseosetosus; antennis rufis, clava infuscata; prothorace transverso, subcordato, lateribus denticulatis, disco septem subfoveolato; elytris striato-punctatis, intervallis latis, planis, singulo elytro septem fasciculato. — Long. $4^1/_2$ mill.

Oblong, faiblement convexe, densément couvert de squamules oblongues, d'un gris flave et garni de soies grises dressées, recourbées en arrière sur les élytres. Antennes rougeâtres, massue noirâtre. Tête transversalement concave, éparsement ponctuée, longitudinalement impressionnée de chaque côté vers la naissance des antennes. Prothorax moins de moitié aussi long que large au sommet, rétréci à la base, subcordiforme; marge antérieure légèrement relevée en bourrelet; côtés denticulés; disque avec six impressions peu profondes, disposées en séries transversales de trois. Ecusson subdemicirculaire. Elytres environ une fois et deux tiers aussi longs que larges ensemble, subacuminés ensemble au sommet, finement ponctués-striés sur le disque, plus fortement sur les côtés; chacun avec six saillies fasciculées, plus ou moins gibbeuses, placées l'une à la base près de l'écusson, trois sur le disque en triangle, en avant du milieu, deux vers le dernier quart de la longueur et une 7me plus forte placée vers le dernier tiers de la longueur, un peu plus près de la suture que du bord latéral. Pattes rougeâtres; dessous noirâtre.

Hab. Grenada — Balthazar (windward side).

Lytopeplus insularis, n. sp.

Oblongus, convexus, nitidus, castaneus; prothorace transverso, antice angustato, lateribus arcuatis, marginatis, sulco marginali profundo, antice posticeque leviter abbreviato; elytris lineato-subsulcatis, sulcis punctisque ad apicem evanescentibus. — Long. $2^1/_2$ mill.

Oblong, convexe, brillant, marron. Tête convexe. Antennes courtes, massue oblongue partagée transversalement en trois zônes. Prothorax transversal, presque demi-circulaire, tronqué en avant, lisse; bords latéraux formant un assez fort bourrelet limité en dedans par un profond sillon n'atteignant pas la base et le sommet. Ecusson subpentagonal. Elytres ovales, environ une fois et un tiers aussi longs que larges; chacun avec cinq lignes de gros points espacés, placés dans des vestiges de sillons et effacées vers le milieu; sur les côtés deux lignes de points également effacées vers le sommet. Tibias antérieurs larges, subanguleux à la tranche externe.

Hab. St. Vincent (leeward side).

Inopeplus insularis, n. sp.

Oblongus, depressus, nitidus, glaber, piceus; antennis tibiisque dilutioribus; elytris arcuatim testaceo-maculatis, apice stricte testaceo-marginatis. — Long. 3 à 5 mill.

Oblong, déprimé, brillant, glabre, noir de poix; antennes, bouche et tibias rougeâtres; élytres marqués d'une tache demi-circulaire, partant des épaules qu'elle occupe largement et se continuant jusqu'à la suture par une étroite et courte bande qui s'avance en arrière sur la suture; sommet étroitement bordé de testacé. Tête peu densément ponctuée, profondément et largement sillonnée entre la naissance des antennes, impressionnée sur le front, avec une strie réunissant cette impression au sillon intermédiaire. Prothorax plus éparsement ponctué que la tête. Elytres très éparsement ponctués, arrondis séparément au sommet. Segments visibles de l'abdomen très finement bordés de testacé au sommet et sur les côtés.

Hab. Grenada — Mount Gay Estate (leeward side), Grand Etang, Chantilly Estate (windward side).

Chez les exemplaires imparfaitement colorés la coloration claire envahit plus ou moins l'ensemble des téguments.

Læmophlœus Smithi, n. sp.

Elongato-oblongus, depressus, vix nitidus, rufo-testaceus; antennis moniliformibus, 2^{0} *articulo* 3^{0} *longiore; capite ante basin antennarum leviter producto, margine antico late emarginato, labro sat magno; prothorace transverso, utrinque carinato, et basin versus foveolato, lateribus undulatis; scutello transverso; singulo elytro tri-carinato.* — Long. $1\frac{1}{2}$ mill.

Oblong, assez allongé, déprimé, à peine brillant, très finement pubescent, roux testacé, légèrement enfumé sur la partie apicale des élytres. Antennes moniliformes, terminées par une massue de trois articles; 3me article de l'antenne plus court que le 2me. Tête et prothorax très finement chagrinés. Marge antérieure de la tête un peu saillante, largement échancrée; labre transversal, bien visible; sur le front une fine impression sulciforme. Prothorax une fois et demie aussi large que long, légèrement rétréci à la base et au sommet; angles antérieurs un peu saillants, bords latéraux ondulés, disque avec une carène longitudinale et une impression près de la base de chaque côté; marge latérale concave. Ecusson transversal. Elytres environ une fois et demie aussi longs que larges, arrondis ensemble au sommet, chacun avec trois carènes longitudinales; marges latérales explanées.

Hab. Grenada — Mount Gay Estate (leeward side).

Voisin de *L. repandus* Grouv. et *carinatus* Reitt. Se distingue de ces deux espèces par la sculpture de la tête et du prothorax qui sont finement granulés ou couverts d'une très dense ponctuation qui leur donne un aspect mat, finement chagriné.

Læmophlœus Caseyi, n. sp.

Elongatus, subparallelus, convexus, subnitidus, glaber, testaceus; antennis moniliformibus, 2º articulo 3º longiore; margine antico capitis sinuato; fronte utrinque in longitudinem impresso; prothorace quadrato, parce punctulato, utrinque unistriato, angulis anticis rectis, posticis obtusis; scutello transverso, subpentagonali; elytris ad apicem conjunctim rotundatis, in disco tristriatis, intervallis vix perspicue striatis. — Long. $1^3/_4$ mill.

Allongé, convexe, un peu brillant, glabre, testacé. Antennes moniliformes, 2me article plus long que la 3me, massue de 3 articles. Tête éparsement pointillée. Labre peu visible, front longitudinalement et assez fortement impressionné de chaque côté. Prothorax un peu moins long que large, à peine rétréci à la base, très éparsement pointillé, longitudinalement strié de chaque côté; angles antérieurs droits, postérieurs obtus; disque avec une courte impression longitudinale sulciforme au milieu de sa marge antérieure. Ecusson plus large que long, subpentagonal. Elytres environ deux fois et demie aussi longs que larges, un peu atténués vers le sommet, arrondis ensemble à l'extrémité; chacun avec trois stries dorsales et dans les intervalles une très fine strie à peine visible, sauf au sommet, et déterminant dans cette partie des intervalles alternés un peu élevés.

Hab. Grenada — Grand Etang (leeward side).

Se placerait dans le tableau des *Lœmophlœus* de l'Amérique du Sud (Ann. Soc. entom. de France, tome LXV (ann. 1896), p. 205) dans le groupe 34 et se distinguerait par sa forme étroite, allongée.

Cryptophilus frater, n. sp.

Oblongus, convexus, nitidus, testaceus, flavo-pubescens; prothorace transversissimo, dense punctato; elytris punctatis, vix perspicue striatis. — Long. $1^1/_2$ mill.

Oblong, convexe, brillant, testacé, couvert d'une pubescence courte, pas très serrée, flave. Septième article des antennes un peu plus épais que les 6me et 8me. Prothorax un peu plus de deux fois plus large que long, sensiblement aussi large à la base qu' au sommet, régulièrement mais peu fortement arqué sur les côtés, tronqué à la base et au sommet, sans trace de fossettes contre la base, densément et assez fortement ponctué. Ecusson transversal. Elytres presque quatre fois plus longs que le prothorax, finement ponctués en lignes, à peine visiblement striés.

Hab. Grenada — Soubise (windward side).

Espèce voisine du *Cryptophilus integer* Heer, mais distincte par sa taille notablement plus petite, son prothorax plus transversal et sa pubescence encore plus courte.

Diplocœlus (Marginus) similis, n. sp.

Oblongus, modice convexus, subnitidus, brunneo-castaneus, dense flavo-pubescens; prothorace parce punctato; elytris lineato-punctatis, punctis circa scutellum et juxta basin suturæ evanescentibus. — Long. 2 mill.

Oblong, modérément convexe, peu brillant, brun marron, couvert d'une pubescence gris flave, assez dense, composée de poils assez longs, presque couchés, disposés par petits faisceaux de quelques poils convergents et de poils plus courts et plus fins uniformément répartis, assez densément serrés, mais ne masquant pas le fond du tégument. Prothorax plus de deux fois plus large à la base que long, rétréci au sommet, éparsement et finement ponctué sur le disque. Elytres ponctués en lignes, ponctuation presque effacée sur le disque autour de l'écusson et le long de la suture dans la partie basilaire. Strie suturale bien marquée dans la moitié apicale.

Hab. Grenada — Mount Gay Estate (leeward side).

Espèce voisine du *Marginus rudis* Lec., distincte par sa ponctuation presque effacée sur le prothorax et sur le disque des élytres dans la partie basilaire.

Psephenops, nov. gen.

Primus et secundus articulus antennarum incrassati.

Palpi maxillares elongati; ultimus articulus elongatus, ovatus.

Trochantinus conspicuus.

Abdomen segmentis ventralibus sex.

Pedes tenues; tarsis elongatis, articulo primo brevi, lobato, 2° elongato, lobato, 3° et 4° brevibus.

Processus prosternalis strictus, canaliculatus, apice acuminatus.

Genre remarquable par la conformation des tarses dont le 1er article court et le 2me très allongé sont terminés par des lobes en forme de cornet.

Psephenops Smithi, n. sp.

Oblongus, vix convexus, fuscus, pube brevi flavo-cinerea vestitus; prothorace transverso, antice angustato, lateribus subrectis, angulis posticis acutis, disco in longitudinem, ante scutellum carinato; scutello subtriangulari, concavo, glabro; elytris vage punctato-striatis, ad apicem separatim rotundatis. — Long. 3 mill.

Oblong, à peine convexe, peu brillant, brun olivâtre, plus foncé sur la tête et le prothorax, couvert d'une pubescence grisâtre sur les élytres, plus foncée sur la tête et le prothorax. Antennes noires, les deux premiers articles un peu moins foncés; pattes d'un testacé enfumé. Prothorax un peu plus de deux fois plus large à la base que long, rétréci au sommet; côtés droits; bord antérieur arqué, base faiblement échancrée devant l'écusson, sinué de chaque côté; angles antérieurs effacés, postérieurs aigus; sur le disque devant l'écusson une courte carène longitudinale. Ecusson subtriangulaire, légèrement enfoncé. Elytres environ quatre fois plus longs que le prothorax, un peu élargis vers le sommet, arrondis séparément, portant des vestiges de stries ponctuées le long de la suture.

4me segment abdominal du mâle impressionné de chaque côté, 5me échancré laissant voir les deux segments de l'armature génitale.

Hab. Grenada — Mt. Maitland (leeward side), Chantilly Estate (windward side); St. Vincent.

Xexanchorinus, nov. gen.

Prosternum parallelum, ad apicem acuminatum.
Metasternum in longitudinem sulcatum.
Segmenta abdominis æqualia.
Palpi maxillares filiformes.

Genre voisin des *Xexanchorus* mais présentant une physionomie qui le rapproche des *Psephenus*.

Xexanchorinus latus, n. sp.

Oblongo-ovatus, sat latus, vix convexus, nigro-fuscus; pube brevi, flavo-cinerea sat dense vestitus; capite prothoraceque opacis, elytris subnitidis; prothorace transversissimo, antice angustato, lateribus rectis, angulis anticis obtusis, posticis rotundatis; elytris sat elongatis, obsolete sulcatis, intervallis alternis subelevatis. — Long. 4 mill.

Oblong, assez large, très légèrement convexe, noirâtre sur la tête et le prothorax, un peu plus brun sur les élytres, couvert d'une pubescence grise, courte, assez serrée. Antennes des Potamophiliens vrais. Front présentant une faible élévation transversale. Prothorax environ d'un tiers aussi long que large à la base, notablement rétréci au sommet; côtés droits; angles antérieurs obtus, postérieurs assez largement arrondis; sommet arqué en avant dans le milieu, sinué de chaque côté; marges latérales pas très largement explanées; disque présentant de chaque côté en arrière du milieu une faible dépression. Ecusson en triangle curviligne. Elytres plus de cinq fois plus longs que le prothorax, obsolètement striés; intervalles alternes vaguement élevés; extrémités arrondies séparément.

Hab. Grenada — Chantilly Estate (windward side).

Phanocerus congener, n. sp.

Oblongus, convexus, fuscus, pube brevi flava sat dense vestitus; prothorace transverso, antice angustato, lateribus bi-sinuatis, disco in longitudinem subcarinato, utrinque striato, stria sinuata; elytris striato-punctatis; antennis clava excepta, pedibusque fusco-testaceis. — Long. $2^1/_3$ mill.

Oblong, convexe, brun olivâtre, couvert d'une pubescence flave, serrée, courte, entremêlée sur la tête, le prothorax et le rebord latéral des élytres de poils plus longs, dressés, bruns. Antennes, sauf la massue, d'un testacé un peu enfumé, articles 1 et 2 frangés de poils noirs, assez allongés, surtout à l'extrémité du 2me article. Prothorax transversal, obsolètement caréné sur le disque, avec deux impressions obliques à la base de la carène, enclosant un espace triangulaire un peu saillant; de chaque côté du disque une strie longitudinale sinuée en dedans, déterminant avec le rebord latéral un espace légèrement concave en avant, longitudinalement convexe un peu avant le milieu, et assez étroitement explané vers la base; bords latéraux par suite bisinués; angles antérieurs presque marqués. Ecusson transversal, suborbiculaire. Elytres ponctués-striés jusqu'au sommet.

Hab. Grenada — Balthazar (windward side).

Helmis Smithi, n. sp.

Oblonga, convexa, subopaca, fusco-castanea, tenue pubescens; prothorace transverso, granoso, in longitudinem sulcato, utrinque carinato, carinis antice abbreviatis, lateribus arcuatis, marginatis; elytris subcoriaceis, punctato-striatis, intervallis 3 *et* 5 *elevatis; antennis pedibusque fusco-testaceis.* — Long. 2 mill.

Oblong, convexe, peu brillant, brun marron, finement pubescent. Antennes et pattes testacées, légèrement enfumées. Front déprimé, finement granuleux, impressionné de chaque côté vers la naissance des antennes. Prothorax un peu moins de deux fois plus large que long, granuleux; sur le disque un sillon longitudinal, de chaque côté une carène ondulée au milieu, atténuée vers le sommet; bords latéraux arqués, rebordés d'un fin bourrelet granuleux. Ecusson ovale. Elytres environ une fois et demie aussi longs que larges, finement chagrinés, ponctués-striés; 3me et 5me intervalles en partant de la suture relevés, le premier surtout vers la base, le second sur presque toute la longueur; strie suturale profondément enfoncée au sommet.

Hab. Grenada — Mount Gay Estate (leeward side).

Espèce voisine des *H. ferruginea* Horn, *sulcata* Grouv., *subsulcata* Grouv., *flavipes* Grouv., *granosa* Grouv. et *granulosa* Sharp. Sa couleur brun marron clair la rapproche surtout de *ferruginea.* Elle se distingue de cette dernière espèce par l'impression longitudinale du disque du prothorax qui forme un véritable sillon, tandis que chez l'autre espèce elle se trouve limitée aux extrémités, et par les carènes latérales qui n'atteignent pas le sommet.

TABLEAU DE CES ESPÈCES.

1.	Sillon longitudinal du disque du prothorax accompagné à la base, de chaque côté, d'une impression ponctiforme.	2.
	Sillon longitudinal du disque du prothorax sans impression ponctiforme de chaque côté à la base.	4.
2.	Sillon longitudinal effacé à la base; impressions ponctiformes petites; brun foncé.	*granosa* Grouv.
	Sillon longitudinal entier; impressions ponctiformes plus fortes.	3.
3.	Noir.	*sulcata* Grouv.
	Brun; épaules rougeâtres.	*subsulcata* Grouv.
4.	Prothorax moins large que les élytres; noir; élytres brillants	*flavipes* Grouv.
	Brun ou brun ferrugineux	5.
5.	Stries des élytres à peine visibles. . . .	*granulosa* Sharp.
	» » » bien marquées	6.
6.	Impression du disque du prothorax large, non nettement sulciforme; carènes latérales entières	*ferruginea* Horn.
	Impression du disque du prothorax sulciforme; carènes latérales écourtées au sommet	*Smithi* Grouv.

Paris, 3 Février 1898.